



คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำอธิบายตัวชี้วัด (Template)

ชื่อตัวชี้วัด :	
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของบริการติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ refer ปรึกษาใกล้บ้านได้รับการดูแลต่อเนื่อง	
หน่วยวัด :	เป้าหมาย :
ร้อยละ	ร้อยละ 80

คำอธิบาย : ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ Depressive disorder ตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก ฉบับที่ 10 (ICD-10) และเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-V) และมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ refer ปรึกษาใกล้บ้าน หมายถึง ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ refer ปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน ได้รับการดูแลต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติ

สูตร/วิธีการคำนวณ :

$\frac{\text{จำนวนของบริการติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ในเดือน}}{\text{จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในเดือนทั้งหมดที่ refer ในเดือนนั้น}} \times 100$

เกณฑ์การให้คะแนน :

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

คะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
ผลงาน	รอบ 6 เดือนแรก	รอบ 6 เดือนหลัง
1	70	70
2	75	75
3	80	80
4	85	85
5	90	90

เงื่อนไข : ไม่มี

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		57	58	59
ร้อยละของบริการติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่ refer ปรึกษาใกล้บ้าน ได้รับการดูแลต่อเนื่อง	ร้อยละ	100	100	100

